

LOCASOL

Komplett pulver til kostbehandling av sykdommer i kalsiummetabolismen hos spedbarn og barn.

Locasol er egnet til kostbehandling av sykdommer i kalsiummetabolismen, f.eks. hyperkalsemi/-uri eller osteopetrose, der ekstreme begrensninger av kalsium og vitamin D er nødvendig. Produktet inneholder melkeprotein, karbohydrat, fett, vitaminer, mineraler og sporstoffer og har et svært lavt innhold av kalsium og er ikke tilsatt vitamin D. Locasol er ernæringsmessig komplett og kan brukes som eneste ernæringskilde til spedbarn og som tilskudd til barn fra 1 år.



Locasol inneholder per 100 ml med en konsentrasjon på 12,9 g/100 ml:

- 66 kcal
- 3,4 g fett fra palme-, raps-, kokos-, og solsikkeolje (71 E%)
- 6,9 g karbohydrat fra glukosesirup (41 E%)
- 1,9 g protein fra melk (12 E%)

Smaksvarianter

Nøytral smak.

Indikasjon

Til kostbehandling av sykdommer i kalsiummetabolismen, f.eks. f.eks. hyperkalsemi/-uri eller osteopetrose, hvor ekstreme begrensninger av kalsium og vitamin D er nødvendig.

Dosering

Doseringen er individuell og gjøres i samråd med lege eller klinisk ernæringsfysiolog.

Forsiktighetsregler

Kun til enteralt bruk. Må ikke gis parenteralt. Morsmelk er den beste ernæringen for spedbarn. Skal brukes under medisinsk tilsyn, etter at alle ernæringsmuligheter har blitt vurdert, herunder amming. Egnet som eneste ernæringskilde til spedbarn og som tilskudd til småbarn fra 1 år.

Tilberedning

Bruk alltid måleskjeen som følger med boksen for å oppnå korrekt dosering. For hver måleskje (4,3 g) tilsettes 30 ml vann for å oppnå anbefalt konsentrasjon (12,9 % vekt/volum). I begynnelsen kan en lavere konsentrasjon være nødvendig for å sikre god toleranse. Pulveret er ikke sterilt og skal derfor tilberedes umiddelbart før mating. Må ikke kokes eller varmes i mikrobølgeovn.

Ved tilberedning til flaskeernæring:

1. Vask hendene godt og rengjør tilberedningsområdet. Steriliser tåteflasker og smokker.
2. Kok friskt vann i 5 minutter eller til vannkokeren slår seg av. Avkjøl vannet i minst 30 minutter til det kjennes kroppstemperert på innsiden av håndleddet. Tilsett 2/3 av nødvendig mengde vann i en sterilisert tåteflaske.
3. Fyll den vedlagte måleskjeen med pulver og jevn ut med en ren, tørr kniv. Ikke trykk pulveret ned i måleskjeen. Bruk kun vedlagte måleskje.
4. Tilsett anbefalt antall måleskjeer av pulveret til vannet. Sett korken på flasken og rist flasken til pulveret er oppløst. Før måltidet, husk å kontrollere at blandingen har rett temperatur ved å ta noen dråper på innsiden av håndleddet.
5. Brukes umiddelbart etter tilberedning. Rester av produktet som er igjen i flasken skal kastes etter en time. Produktet må ikke varmes opp på nytt under måltidet.

Ved tilberedning av sondeernæring og næringsdrikke:

1. Vask hendene godt og steriliser utstyret.
2. Bruk avkjølt, nykott vann.
3. Bruk den vedlagte måleskjeen eller vei opp anbefalt mengde pulver.
4. Tilsett litt av vannet og rør med en gaffel til jevn røre.
5. Fortsett å røre mens resten av vannet tilsettes til den anbefalte fortyningen er oppnådd.
6. Serveres ved romtemperatur. Brukes umiddelbart etter tilberedning. Rester skal alltid kastes.
7. Som næringsdrikke: Tilberedt produkt som er igjen 1 time etter måltidet, skal kastes. Produktet må ikke varmes opp på nytt under måltidet.
8. Ved sondeernæring: Hengetid skal ikke overskride 2 timer.

Holdbarhet og oppbevaring

Åpnet boks oppbevares tørt og svalt, ikke over normal romtemperatur. Sett alltid lokket på etter bruk. Åpnet boks brukes innen 1 måned. Best før-dato finner du på boksen.

BESTILLINGSINFORMASJON

Produktnavn	Bestillingsnr.	Varenr.	Salgsenhet
Locasol	195413	950547	1 boks à 400 g

Næringsinnhold per

		100 g	100 ml (12,9 g)
Energi	kJ	2149	277
	kcal	514	66
Fett	g	26,7	3,4
- hvorav mettede fettsyrer	g	11,9	1,5
- enumettede fettsyrer	g	10,8	1,4
- flerumettede fettsyrer	g	4,1	0,52
-- linolsyre (LA)	g	3,23	0,416
-- α-linolensyre (ALA)	g	0,33	0,042
-- arakidonsyre (ARA)	g	0,13	0,0166
-- dokosaheksaensyre (DHA)	g	0,12	0,0166
Karbohydrater	g	53,7	6,9
- hvorav sukkerarter	g	52,8	6,8
-- laktose	g	52,7	6,80
Kostfiber	g	0	0
Protein	g	14,8	1,9
Salt	g	0,56	0,07
Mineraler og sporstoffer			
Natrium	mg (mmol)	223 (9,69)	28,7 (1,25)
Kalium	mg (mmol)	512 (13,1)	66,1 (1,69)
Klorid	mg (mmol)	384 (10,8)	49,6 (1,40)
Kalsium	mg (mmol)	<40,0 (<1,00)	<5,16 (<0,13)
Fosfor	mg (PO ₄ mmol)	171 (5,54)	22,1 (0,71)
Magnesium	mg (mmol)	42,7 (1,76)	5,51 (0,23)
Jern	mg	7,78	1,00
Sink	mg	3,89	0,50
Kobber	mg	0,39	0,050
Mangan	mg	0,051	0,007
Molybden	µg	19,4	2,51
Selen	µg	20,6	2,66
Krom	µg	15,4	1,99
Jod	µg	69,3	12,4
Vitaminer			
Vitamin A	µg RE	584	75,3
Vitamin D	µg	ikke tilsatt	ikke tilsatt
Vitamin E	mg (mg TE)	10,3 (9,06)	1,33 (1,17)
Vitamin C	mg	69,6	8,97
Vitamin K	µg	25,3	3,26
Tiamin	mg	0,46	0,06
Riboflavin	mg	0,77	0,10
Niacin	mg (mg NE)	4,66 (8,14)	0,60 (1,05)
Pantotensyre	mg	3,71	0,41
Vitamin B ₆	mg	0,29	0,04
Folinsyre	µg	69,8	9,00
Folat	µg	120	15,5
Vitamin B ₁₂	µg	0,97	0,12
Biotin	µg	14,0	1,80
Annet			
L-karnitin	mg	30,2	3,89
Kolin	mg	160	20,7
Inositol	mg	25,6	3,31
Taurin	mg	6,96	0,90
Osmolaritet	mOsmol/l		261
Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O		290

Ingredienser

Laktose (fra kumelk), vegetabiliske oljer (palmeolje, solsikkeolje, kokosolje, rapsolje), natriumkaseinat (fra kumelk), demineralisert myse (fra kumelk), kaliumklorid, L-cystin, fiskeolje, kolinbitartrat, olje fra *Mortierella alpina*, dikaliumhydrogenfosfat, magnesiumsulfat, magnesiumhydrogenfosfat, L-askorbinsyre, L-karnitin, jernsulfat, inositol, antioksidant (askorbylpalmitat), sinkulfat, taurin, natriumkarbonat, nikotinamid, DL-α-tokoferol, kalsium D-pantotenat, kaliumjodid, kobbersulfat, retinylacetat, tiaminmononitrat, riboflavin, pyridoxinhydroklorid, mangansulfat, pteroylmonoglutaminsyre, kromklorid, natriummolybdat, natriumselenitt, fytomenadin, D-biotin, cyanocobalamin.

Nutricias produkter er registrerte næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell

Nutricia c/o Danone AS | Tlf. +47 23 00 21 00 | E-post nutricia.amno@nutricia.com | www.nutricia.no