

CUBITAN: RASKERE TILHELING AV TRYKKSÅR¹

Måleverktøy for trykksår



1.Cereda E et al. Ann Intern Med 2015; 162: 167-174

Cubitan er godkjent som næringsmiddel til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell.

NUTRICIA
Cubitan

Cubitan doserings- veiledning

Behandling med
Cubitan bør benyttes
til såret er fullstendig
tilgrodd.

Nutricia Norge AS

Drammensveien 123, 0277 Oslo

Tlf: 23 00 21 00,

Fax: 22 44 88 88

E-post: nutricia@nutricia.no

www.nutricia.no

GRAD I 1 FLASKE PER DAG*

- Lokal rødhet som ikke blekner ved trykk.



GRAD II 2 FLASKER PER DAG*

- Skade på deler av hudlaget.
- Skaden omfatter epidermis og/eller dermis.
- Åpent sår, ofte blemmer.



GRAD III 3 FLASKER PER DAG*

- Skade på alle hudlag.
- Skaden omfatter epidermis, dermis og subcutis.
- Sår ligner krater. Dypt sår, ofte med hulrom.



GRAD IV 3 FLASKER PER DAG*

- Dypt sår, gjennom alle hudlag.
- Sår gjennom muskellag, helt ned til muskelfascia/sener/ben.



* Ernæringsinntak må vurderes i henhold til pasientens individuelle behov og skal brukes i samråd med helsepersonell.